

# Klyde

Klyden kommer til Vadehavet i begyndelsen af marts fra det sydlige Europa. Herefter kan de gå på de blotlagte mudderbanker i store flokke og finde føde. Man kan se den frem til september/oktober.



## Sjov information

For at forsvare sin rede og sine unger spiller klyden syg, og foregiver at have brækket sin vinge, så den ikke kan flyve. Derved håber den at ræven vil interessere sig mere for forældrefuglen end for æggene eller ungerne. Når den har fået ræven væk, og ræven nærmer sig "den syge" fugl, letter den og flyver væk, og derved har den forhåbentlig reddet sine æg eller unger. Det samme skuespil opleves hvis mennesker nærmer sig yngleområdet.

## Udseende

Klyden er meget karakteristisk med sin sorthvide fjerdragt, sit lange opadbøjede næb og meget lange gråblå ben. Den er cirka på størrelse med en allike.

## Alder

Klyden kan blive op til 25 år.

## Æg/unger

Klyden lægger 2-4 æg, og allerede når ungerne kommer ud af æggene, kan de selv løbe rundt og finde deres mad.

## Føde

Når klyden søger føden, svinger den sit hoved fra side til side, således at den med næbbet fejer vandet og filtrerer det for spiselig ting. Det er små krebsdyr, dyndsnegle, alger og lignende. Under fødesøgningen kan klyden svømme, hvilket er ualmindeligt hos vadefuglene. Dette kan den, fordi den er en af de få vadefuglearter, som har svømmehud mellem tæerne.

## Levested

Den yngler på rævefri øer og på strandenge. Efter yngletiden samler fuglene sig bl.a. i Ho Bugt og ved Rømødæmningen, hvor de ved lavvande søger føde og ved højvande står og hviler på højvandsrasteplasserne i store tætte flokke, som giver en fantastisk collage i sort og hvidt.

## Fjender

Klydens største fjende er ræven. Især når klyden yngler på strandenge er den udsat for angreb af ræv. Den største trussel mod klyden i dag, er uden tvivl mink og mårhund, som er gode svømmere og nemt kan komme ud til yngleøerne.

Det store ta' selv bord

